

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



НЕПОКЛОНОВ

31 МАР 2014

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Кетофен 5, 10, 20 мг для лечения воспалительных заболеваний
опорно-двигательного аппарата у собак и кошек

(организация-разработчик: компания «Merial», Франция)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Кетофен 5, 10, 20 мг (Ketofen 5, 10, 20 mg).

Международное непатентованное наименование: кетопрофен.

2. Лекарственная форма: таблетки. Препарат в качестве действующего вещества в 1 таблетке массой 125 мг, 250 мг и 500 мг содержит кетопрофен соответственно 5 мг, 10 мг и 20 мг, а также вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза – 10%, лактулоза – 10%, стеарат магния – 0,5%, лактоза – до 100%.

3. Препарат выпускают по 10 таблеток в блистерах, упакованных поштучно в картонные коробки.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0°C до 25°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства. Запрещается применение Кетофена 5, 10, 20 мг по истечении срока годности.

5. Кетофен 5, 10, 20 мг следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Кетофен 5, 10, 20 мг – нестероидный противовоспалительный лекарственный препарат.

Кетопрофен, входящий в состав препарата, является производным пропионовой кислоты, обладает выраженным противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием. Механизм действия основан на подавлении синтеза простагландинов в результате воздействия на метаболизм арахидоновой кислоты.

При пероральном введении максимальная концентрация кетопрофена в плазме крови отмечается через 30-45 минут, выводится препарат из организма преимущественно с мочой.

Кетофен 5, 10, 20 мг по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает сенсибилизирующего и эмбриотоксического действия, не кумулируется в организме.

III. Порядок применения

8. Кетофен 5, 10, 20 мг назначают собакам и кошкам в качестве противовоспалительного, анальгезирующего и жаропонижающего средства при острых и хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата, в том числе артрозах, артритах, травмах, грыжах межпозвоночных дисков, для снятия воспалительных и болевых реакций после оперативных вмешательств.

9. Противопоказанием для применения является повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе). Не следует применять препарат при язве

желудка и двенадцатиперстной кишки, геморрагическом синдроме, тяжелой форме почечной недостаточности.

Животным с заболеваниями сердца, почек, печени препарат применяют с осторожностью под наблюдением ветеринарного врача.

10. Кетофен 5, 10, 20 мг применяют индивидуально перорально один раз в сутки во время кормления в дозе 1 мг кетопрофена (действующего вещества) на 1 кг массы животного. Курс лечения в зависимости от состояния животного составляет 3-5 дней и определяется лечащим ветеринарным врачом.

11. При передозировке препарата может наблюдаться повышенное слюноотделение и рвота. Возможно проявление симптомов желудочного кровотечения.

12. Особенности действия при первом приеме препарата и при его отмене не выявлено.

13. При пропуске очередной дозы препарата курс применения необходимо возобновить в той же дозе и схеме применения.

14. У некоторых животных после применения препарата может возникать раздражение слизистой желудка и рвота. Указанные симптомы исчезают самопроизвольно, и обычно не требуют дополнительного медицинского вмешательства. В случае проявления аллергических реакций у чувствительного к компонентам препарата животного его применение прекращают и назначают симптоматическое лечение.

15. Не следует применять Кетофен 5, 10, 20 мг одновременно с другими нестероидными противовоспалительными препаратами, диуретиками и антикоагулянтами.

16. Кетофен 5, 10, 20 мг не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Кетофеном 5, 10, 20 мг следует соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. После работы с лекарственным препаратом следует вымыть руки с мылом.

18. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Кетофеном 5, 10 и 20 мг. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата внутрь следует обратиться в медицинское учреждение, имея при себе инструкцию по применению препарата или этикетку.

19. Блистеры и картонные коробки из-под препарата помещают в целлофановый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

20. Организация - производитель: компания «Merial», 29 avenue Tony Garnier, 69007, Lyon, France.

Адрес места производства: «Merial», 4 chemin du Calquet, 31000, Toulouse, France.

Инструкция разработана компанией «Merial» (Франция) совместно с Бизнес-подразделением «Мериал» (г. Москва).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Кетопрофена 5, 10, 20 мг, утвержденная Россельхознадзором 11 августа 2011 года.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения